Таблица 1

Сведения о схемах лечения COVID-19 (тяжелое течение заболевания)

Номер схемы	Наименование лекарственного препарата	Описание схемы	Дозировка	Средняя площадь тела ($м^2$)	Средний вес (кг)	Единица действующего вещ-ва	Средняя суточная доза	Среднее кол-во дней введения в госпитализации
Схема 1.1	Фавипиравир	Для пациентов с массой тела < 75 кг: по 1600 мг 2 р/сут в 1-й день и далее по 600 мг 2 р/сут со 2 по 10 день.	3200	x	x	мг	3 200	0,5
	Фавипиравир	Для пациентов с массой тела < 75 кг: по 1600 мг 2 р/сут в 1-й день и далее по 600 мг 2 р/сут со 2 по 10 день.	1200	x	x	мг	1 200	4,5
	Фавипиравир	Для пациентов с массой тела 75 кг и более: по 1800 мг 2 раза/сут в 1-й день, далее по 800 мг 2 раза/сут со 2 по 10 день.	3600	x	x	мг	3 600	0,5
	Фавипиравир	Для пациентов с массой тела 75 кг и более: по 1800 мг 2 раза/сут в 1-й день, далее по 800 мг 2 раза/сут со 2 по 10 день.	1600	x	x	мг	1 600	4,5
	Тоцилизумаб	4 - 8 мг/кг/введение 400 мг разводят в 100 мл 0,9% раствора NaCl, вводят в/в капельно. Вводить не более 800 мг. При недостаточном эффекте повторить введение через 12 ч.	6	x	70	мг	420	1
	Тоцилизумаб	4 - 8 мг/кг/введение 400 мг разводят в 100 мл 0,9% раствора NaCl, вводят в/в капельно. Вводить не более 800 мг. При недостаточном эффекте повторить введение через 12 ч.	6	x	70	мг	420	0,1
	Нефракционированный гепарин	Подкожно 5000 ЕД 2 - 3 раза/сут.	12,5	x	x	тыс. ЕД	13	9
	Эноксапарин натрия	Подкожно 4000 анти-Ха МЕ (40 мг) 1 раз/сут.	4	x	x	тыс. анти-Ха МЕ	4	0,5
	Парнапарин натрия	Подкожно 0,3 мл (3200 анти-Ха МЕ) или 0,4 мг (4250 анти-Ха МЕ) 1 раз/сут	3200	x	x	анти-Ха МЕ	3 200	0,5
	Кетопрофен	Рекомендуемая доза для взрослых 50 мг каждые 8-12 часов (по показаниям)	125	x	x	мг	125	2,8
	Амоксициллин+[Клавулановая кислота]	При лихорадке (t > 38,0 °С) более 3 дней при тяжёлом течении назначается антибактериальная терапия по показаниям (875+125 мг в раза в сутки)	2000	x	x	мг	2 000	2,1
Схема 1.2	Фавипиравир	Для пациентов с массой тела < 75 кг: по 1600 мг 2 р/сут в 1-й день и далее по 600 мг 2 р/сут со 2 по 10 день.	3200	x	x	мг	3 200	0,5
	Фавипиравир	Для пациентов с массой тела < 75 кг: по 1600 мг 2 р/сут в 1-й день и далее по 600 мг 2 р/сут со 2 по 10 день.	1200	x	x	мг	1 200	4,5
	Фавипиравир	Для пациентов с массой тела 75 кг и более: по 1800 мг 2 раза/сут в 1-й день, далее по 800 мг 2 раза/сут со 2 по 10 день.	3600	x	x	мг	3 600	0,5
	Фавипиравир	Для пациентов с массой тела 75 кг и более: по 1800 мг 2 раза/сут в 1-й день, далее по 800 мг 2 раза/сут со 2 по 10 день.	1600	x	x	мг	1 600	4,5
	Сарилумаб	200 мг или 400 мг (предварительно заполненную шприц-ручку 200 мг) развести в 100 мл 0,9% раствора NaCl, вводить в/в, при недостаточном эффекте повторить введение через 12 ч.	200	x	x	мг	200	0,5
	Сарилумаб	200 мг или 400 мг (предварительно заполненную шприц-ручку 200 мг) развести в 100 мл 0,9% раствора NaCl, вводить в/в, при недостаточном эффекте повторить введение через 12 ч.	400	x	x	мг	400	0,5
	Сарилумаб	200 мг или 400 мг (предварительно заполненную шприц-ручку 200 мг) развести в 100 мл 0,9% раствора NaCl, вводить в/в, при недостаточном эффекте повторить введение через 12 ч.	200	x	x	мг	200	0,05
	Сарилумаб	200 мг или 400 мг (предварительно заполненную шприц-ручку 200 мг) развести в 100 мл 0,9% раствора NaCl, вводить в/в, при недостаточном эффекте повторить введение через 12 ч.	400	x	x	мг	400	0,05
	Нефракционированный гепарин	Подкожно 5000 ЕД 2 - 3 раза/сут.	12,5	x	x	тыс. ЕД	13	9
	Эноксапарин натрия	Подкожно 4000 анти-Ха МЕ (40 мг) 1 раз/сут.	4	x	x	тыс. анти-Ха МЕ	4	0,5
	Парнапарин натрия	Подкожно 0,3 мл (3200 анти-Ха МЕ) или 0,4 мг (4250 анти-Ха МЕ) 1 раз/сут	3200	x	x	анти-Ха МЕ	3 200	0,5
	Кетопрофен	Рекомендуемая доза для взрослых 50 мг каждые 8-12 часов (по показаниям)	125	x	x	мг	125	2,8
	Амоксициллин+[Клавулановая кислота]	При лихорадке (t > 38,0 °С) более 3 дней при тяжёлом течении назначается антибактериальная терапия по показаниям (875+125 мг в раза в сутки)	2000	x	x	мг	2 000	2,1
	Дорогостоящие препараты упреждающей противовоспалительной терапии COVID-19							

Таблица 2

Сведения о схемах лечения COVID-19 (крайне тяжелое течение заболевания)

Номер схемы	Наименование лекарственного препарата	Описание схемы	Дозировка	Средняя площадь тела ($м^2$)	Средний вес (кг)	Единица действующего вещ-ва	Средняя суточная доза	Среднее кол-во дней введения в госпитализации
Схема 1.1	Метилпреднизолон	1 мг/кг на введение в/в каждые 12 ч в течение 3-х суток, с постепенным снижением дозы на 20 - 25% на введение каждые 1 - 2 суток в течение 3 - 4 суток, далее на 50% каждые 1 - 2 суток до полной отмены. При прогрессировании: 120 - 125 мг/введение/в/в каждые 6 - 8 ч.	2	x	70	мг	140	3
	Метилпреднизолон	1 мг/кг на введение в/в каждые 12 ч в течение 3-х суток, с постепенным снижением дозы на 20 - 25% на введение каждые 1 - 2 суток в течение 3 - 4 суток, далее на 50% каждые 1 - 2 суток до полной отмены. При прогрессировании: 120 - 125 мг/введение/в/в каждые 6 - 8 ч.	1,55	x	70	мг	109	1,5
	Метилпреднизолон	1 мг/кг на введение в/в каждые 12 ч в течение 3-х суток, с постепенным снижением дозы на 20 - 25% на введение каждые 1 - 2 суток в течение 3 - 4 суток, далее на 50% каждые 1 - 2 суток до полной отмены. При прогрессировании: 120 - 125 мг/введение/в/в каждые 6 - 8 ч.	1,20	x	70	мг	84	1,5
	Метилпреднизолон	1 мг/кг на введение в/в каждые 12 ч в течение 3-х суток, с постепенным снижением дозы на 20 - 25% на введение каждые 1 - 2 суток в течение 3 - 4 суток, далее на 50% каждые 1 - 2 суток до полной отмены. При прогрессировании: 120 - 125 мг/введение/в/в каждые 6 - 8 ч.	0,60	x	70	мг	42	1,5
	Метилпреднизолон	1 мг/кг на введение в/в каждые 12 ч в течение 3-х суток, с постепенным снижением дозы на 20 - 25% на введение каждые 1 - 2 суток в течение 3 - 4 суток, далее на 50% каждые 1 - 2 суток до полной отмены. При прогрессировании: 120 - 125 мг/введение/в/в каждые 6 - 8 ч.	428,75	x	x	мг	429	1,5
	Тоцилизумаб	4 - 8 мг/кг/введение 400 мг разводят в 100 мл 0,9% раствора NaCl, вводят в/в капельно. Вводить не более 800 мг. При недостаточном эффекте повторить введение через 12 ч.	6	x	70	мг	420	1
	Тоцилизумаб	4 - 8 мг/кг/введение 400 мг разводят в 100 мл 0,9% раствора NaCl, вводят в/в капельно. Вводить не более 800 мг. При недостаточном эффекте повторить введение через 12 ч.	6	x	70	мг	420	0,1
	Нефракционированный гепарин	Подкожно 5000 ЕД 2 - 3 раза/сут.	12,5	x	x	тыс. ЕД	13	7,2
	Эноксапарин натрия	Подкожно 4000 анти-Ха МЕ (40 мг) 1 раз/сут.	4	x	x	тыс. анти-Ха МЕ	4	0,4
	Парнапарин натрия	Подкожно 0,3 мл (3200 анти-Ха МЕ) или 0,4 мг (4250 анти-Ха МЕ) 1 раз/сут	3200	x	x	анти-Ха МЕ	3 200	0,4
Схема 1.2	Метилпреднизолон	1 мг/кг на введение в/в каждые 12 ч в течение 3-х суток, с постепенным снижением дозы на 20 - 25% на введение каждые 1 - 2 суток в течение 3 - 4 суток, далее на 50% каждые 1 - 2 суток до полной отмены. При прогрессировании: 120 - 125 мг/введение/в/в каждые 6 - 8 ч.	2	x	70	мг	140	3
	Метилпреднизолон	1 мг/кг на введение в/в каждые 12 ч в течение 3-х суток, с постепенным снижением дозы на 20 - 25% на введение каждые 1 - 2 суток в течение 3 - 4 суток, далее на 50% каждые 1 - 2 суток до полной отмены. При прогрессировании: 120 - 125 мг/введение/в/в каждые 6 - 8 ч.	1,55	x	70	мг	109	1,5
	Метилпреднизолон	1 мг/кг на введение в/в каждые 12 ч в течение 3-х суток, с постепенным снижением дозы на 20 - 25% на введение каждые 1 - 2 суток в течение 3 - 4 суток, далее на 50% каждые 1 - 2 суток до полной отмены. При прогрессировании: 120 - 125 мг/введение/в/в каждые 6 - 8 ч.	1,20	x	70	мг	84	1,5
	Метилпреднизолон	1 мг/кг на введение в/в каждые 12 ч в течение 3-х суток, с постепенным снижением дозы на 20 - 25% на введение каждые 1 - 2 суток в течение 3 - 4 суток, далее на 50% каждые 1 - 2 суток до полной отмены. При прогрессировании: 120 - 125 мг/введение/в/в каждые 6 - 8 ч.	0,60	x	70	мг	42	1,5
	Метилпреднизолон	1 мг/кг на введение в/в каждые 12 ч в течение 3-х суток, с постепенным снижением дозы на 20 - 25% на введение каждые 1 - 2 суток в течение 3 - 4 суток, далее на 50% каждые 1 - 2 суток до полной отмены. При прогрессировании: 120 - 125 мг/введение/в/в каждые 6 - 8 ч.	428,75	x	x	мг	429	1,5
	Сарилумаб	200 мг или 400 мг (предварительно заполненную шприц-ручку 200 мг) развести в 100 мл 0,9% раствора NaCl, вводить в/в, при недостаточном эффекте повторить введение через 12 ч.	200	x	x	мг	200	0,5
	Сарилумаб	200 мг или 400 мг (предварительно заполненную шприц-ручку 200 мг) развести в 100 мл 0,9% раствора NaCl, вводить в/в, при недостаточном эффекте повторить введение через 12 ч.	400	x	x	мг	400	0,5
	Сарилумаб	200 мг или 400 мг (предварительно заполненную шприц-ручку 200 мг) развести в 100 мл 0,9% раствора NaCl, вводить в/в, при недостаточном эффекте повторить введение через 12 ч.	200	x	x	мг	200	0,05
	Сарилумаб	200 мг или 400 мг (предварительно заполненную шприц-ручку 200 мг) развести в 100 мл 0,9% раствора NaCl, вводить в/в, при недостаточном эффекте повторить введение через 12 ч.	400	x	x	мг	400	0,05
	Нефракционированный гепарин	Подкожно 5000 ЕД 2 - 3 раза/сут.	12,5	x	x	тыс. ЕД	13	7,2
	Эноксапарин натрия	Подкожно 4000 анти-Ха МЕ (40 мг) 1 раз/сут.	4	x	x	тыс. анти-Ха МЕ	4	0,4
	Парнапарин натрия	Подкожно 0,3 мл (3200 анти-Ха МЕ) или 0,4 мг (4250 анти-Ха МЕ) 1 раз/сут	3200	x	x	анти-Ха МЕ	3 200	0,4

Сведения о схемах лечения COVID-19 (крайне тяжелое течение заболевания)

Схема 2.1	Дексаметазон	20 мг/сутки (по 10 мг Х 2 раза в сутки) в/в в течение 3-х суток с постепенным снижением дозы на 20 - 25% на введение каждые 1 - 2 суток, в течение 3 - 4 суток, далее на 50% каждые 1 - 2 суток до полной отмены	20	x	x	мг	20	3
	Дексаметазон	20 мг/сутки (по 10 мг Х 2 раза в сутки) в/в в течение 3-х суток с постепенным снижением дозы на 20 - 25% на введение каждые 1 - 2 суток, в течение 3 - 4 суток, далее на 50% каждые 1 - 2 суток до полной отмены	15,5	x	x	мг	16	1,5
	Дексаметазон	20 мг/сутки (по 10 мг Х 2 раза в сутки) в/в в течение 3-х суток с постепенным снижением дозы на 20 - 25% на введение каждые 1 - 2 суток, в течение 3 - 4 суток, далее на 50% каждые 1 - 2 суток до полной отмены	12,01	x	x	мг	12	1,5
	Дексаметазон	20 мг/сутки (по 10 мг Х 2 раза в сутки) в/в в течение 3-х суток с постепенным снижением дозы на 20 - 25% на введение каждые 1 - 2 суток, в течение 3 - 4 суток, далее на 50% каждые 1 - 2 суток до полной отмены	6,01	x	x	мг	6	1,5
	Тоцилизумаб	4 - 8 мг/кг/введение 400 мг разводят в 100 мл 0,9% раствора NaCl, вводят в/в капельно. Вводить не более 800 мг. При недостаточном эффекте повторить введение через 12 ч.	6	x	70	мг	420	1
	Тоцилизумаб	4 - 8 мг/кг/введение 400 мг разводят в 100 мл 0,9% раствора NaCl, вводят в/в капельно. Вводить не более 800 мг. При недостаточном эффекте повторить введение через 12 ч.	6	x	70	мг	420	0,1
	Нефракционированный гепарин	Подкожно 5000 ЕД 2 - 3 раза/сут.	12,5	x	x	тыс. ЕД	13	7,2
	Эноксапарин натрия	Подкожно 4000 анти-Ха МЕ (40 мг) 1 раз/сут.	4	x	x	тыс. анти-Ха МЕ	4	0,4
	Парнапарин натрия	Подкожно 0,3 мл (3200 анти-Ха МЕ) или 0,4 мг (4250 анти-Ха МЕ) 1 раз/сут	3200	x	x	анти-Ха МЕ	3 200	0,4
Схема 2.2	Дексаметазон	20 мг/сутки (по 10 мг Х 2 раза в сутки) в/в в течение 3-х суток с постепенным снижением дозы на 20 - 25% на введение каждые 1 - 2 суток, в течение 3 - 4 суток, далее на 50% каждые 1 - 2 суток до полной отмены	20	x	x	мг	20	3
	Дексаметазон	20 мг/сутки (по 10 мг Х 2 раза в сутки) в/в в течение 3-х суток с постепенным снижением дозы на 20 - 25% на введение каждые 1 - 2 суток, в течение 3 - 4 суток, далее на 50% каждые 1 - 2 суток до полной отмены	15,5	x	x	мг	16	1,5
	Дексаметазон	20 мг/сутки (по 10 мг Х 2 раза в сутки) в/в в течение 3-х суток с постепенным снижением дозы на 20 - 25% на введение каждые 1 - 2 суток, в течение 3 - 4 суток, далее на 50% каждые 1 - 2 суток до полной отмены	12,01	x	x	мг	12	1,5
	Дексаметазон	20 мг/сутки (по 10 мг Х 2 раза в сутки) в/в в течение 3-х суток с постепенным снижением дозы на 20 - 25% на введение каждые 1 - 2 суток, в течение 3 - 4 суток, далее на 50% каждые 1 - 2 суток до полной отмены	6,01	x	x	мг	6	1,5
	Сарилумаб	200 мг или 400 мг (предварительно заполненную шприц-ручку 200 мг) развести в 100 мл 0,9% раствора NaCl, вводить в/в, при недостаточном эффекте повторить введение через 12 ч.	200	x	x	мг	200	0,5
	Сарилумаб	200 мг или 400 мг (предварительно заполненную шприц-ручку 200 мг) развести в 100 мл 0,9% раствора NaCl, вводить в/в, при недостаточном эффекте повторить введение через 12 ч.	400	x	x	мг	400	0,5
	Сарилумаб	200 мг или 400 мг (предварительно заполненную шприц-ручку 200 мг) развести в 100 мл 0,9% раствора NaCl, вводить в/в, при недостаточном эффекте повторить введение через 12 ч.	200	x	x	мг	200	0,05
	Сарилумаб	200 мг или 400 мг (предварительно заполненную шприц-ручку 200 мг) развести в 100 мл 0,9% раствора NaCl, вводить в/в, при недостаточном эффекте повторить введение через 12 ч.	400	x	x	мг	400	0,05
	Нефракционированный гепарин	Подкожно 5000 ЕД 2 - 3 раза/сут.	12,5	x	x	тыс. ЕД	13	7,2
	Эноксапарин натрия	Подкожно 4000 анти-Ха МЕ (40 мг) 1 раз/сут.	4	x	x	тыс. анти-Ха МЕ	4	0,4
	Парнапарин натрия	Подкожно 0,3 мл (3200 анти-Ха МЕ) или 0,4 мг (4250 анти-Ха МЕ) 1 раз/сут	3200	x	x	анти-Ха МЕ	3 200	0,4

Сведения о схемах лечения COVID-19 (крайне тяжелое течение заболевания)

Схема 3	Метилпреднизолон	1 мг/кг на введение в/в каждые 12 ч в течение 3-х суток, с постепенным снижением дозы на 20 - 25% на введение каждые 1 - 2 суток в течение 3 - 4 суток, далее на 50% каждые 1 - 2 суток до полной отмены. При прогрессировании: 120 - 125 мг/введение/в/в каждые 6 - 8 ч.	2	x	70	мг	140	3
	Метилпреднизолон	1 мг/кг на введение в/в каждые 12 ч в течение 3-х суток, с постепенным снижением дозы на 20 - 25% на введение каждые 1 - 2 суток в течение 3 - 4 суток, далее на 50% каждые 1 - 2 суток до полной отмены. При прогрессировании: 120 - 125 мг/введение/в/в каждые 6 - 8 ч.	1,55	x	70	мг	109	1,5
	Метилпреднизолон	1 мг/кг на введение в/в каждые 12 ч в течение 3-х суток, с постепенным снижением дозы на 20 - 25% на введение каждые 1 - 2 суток в течение 3 - 4 суток, далее на 50% каждые 1 - 2 суток до полной отмены. При прогрессировании: 120 - 125 мг/введение/в/в каждые 6 - 8 ч.	1,20	x	70	мг	84	1,5
	Метилпреднизолон	1 мг/кг на введение в/в каждые 12 ч в течение 3-х суток, с постепенным снижением дозы на 20 - 25% на введение каждые 1 - 2 суток в течение 3 - 4 суток, далее на 50% каждые 1 - 2 суток до полной отмены. При прогрессировании: 120 - 125 мг/введение/в/в каждые 6 - 8 ч.	0,60	x	70	мг	42	1,5
	Метилпреднизолон	1 мг/кг на введение в/в каждые 12 ч в течение 3-х суток, с постепенным снижением дозы на 20 - 25% на введение каждые 1 - 2 суток в течение 3 - 4 суток, далее на 50% каждые 1 - 2 суток до полной отмены. При прогрессировании: 120 - 125 мг/введение/в/в каждые 6 - 8 ч.	428,75	x	x	мг	429	1,5
	Канакинумаб	4 - 8 мг/кг. 150 мг в 1 мл воды для инъекций, далее вводят во флакон с 250 мл 5% раствора глюкозы.	6	x	70	мг	420	1
	Нефракционированный гепарин	Подкожно 5000 ЕД 2 - 3 раза/сут.	12,5	x	x	тыс. ЕД	13	7,2
	Эноксапарин натрия	Подкожно 4000 анти-Ха МЕ (40 мг) 1 раз/сут.	4	x	x	тыс. анти-Ха МЕ	4	0,4
	Парнапарин натрия	Подкожно 0,3 мл (3200 анти-Ха МЕ) или 0,4 мг (4250 анти-Ха МЕ) 1 раз/сут	3200	x	x	анти-Ха МЕ	3 200	0,4
Схема 4	Дексаметазон	20 мг/сутки в/в в течение 3-х суток (по 10 мг Х 2 раза в сутки) в/в с постепенным снижением дозы на 20 - 25% на введение каждые 1 - 2 суток, в течение 3 - 4 суток, далее на 50% каждые 1 - 2 суток до полной отмены	20	x	x	мг	20	3
	Дексаметазон	20 мг/сутки в/в в течение 3-х суток (по 10 мг Х 2 раза в сутки) в/в с постепенным снижением дозы на 20 - 25% на введение каждые 1 - 2 суток, в течение 3 - 4 суток, далее на 50% каждые 1 - 2 суток до полной отмены	15,5	x	x	мг	16	1,5
	Дексаметазон	20 мг/сутки в/в в течение 3-х суток (по 10 мг Х 2 раза в сутки) в/в с постепенным снижением дозы на 20 - 25% на введение каждые 1 - 2 суток, в течение 3 - 4 суток, далее на 50% каждые 1 - 2 суток до полной отмены	12,01	x	x	мг	12	1,5
	Дексаметазон	20 мг/сутки в/в в течение 3-х суток (по 10 мг Х 2 раза в сутки) в/в с постепенным снижением дозы на 20 - 25% на введение каждые 1 - 2 суток, в течение 3 - 4 суток, далее на 50% каждые 1 - 2 суток до полной отмены	6,01	x	x	мг	6	1,5
	Канакинумаб	4 - 8 мг/кг. 150 мг в 1 мл воды для инъекций, далее вводят во флакон с 250 мл 5% раствора глюкозы.	6	x	70	мг	420	1
	Нефракционированный гепарин	Подкожно 5000 ЕД 2 - 3 раза/сут.	12,5	x	x	тыс. ЕД	13	7,2
	Эноксапарин натрия	Подкожно 4000 анти-Ха МЕ (40 мг) 1 раз/сут.	4	x	x	тыс. анти-Ха МЕ	4	0,4
	Парнапарин натрия	Подкожно 0,3 мл (3200 анти-Ха МЕ) или 0,4 мг (4250 анти-Ха МЕ) 1 раз/сут	3200	x	x	анти-Ха МЕ	3 200	0,4
Схема 5.1	Метилпреднизолон	1 мг/кг на введение в/в каждые 12 ч в течение 3-х суток, с постепенным снижением дозы на 20 - 25% на введение каждые 1 - 2 суток в течение 3 - 4 суток, далее на 50% каждые 1 - 2 суток до полной отмены. При прогрессировании: 120 - 125 мг/введение/в/в каждые 6 - 8 ч.	2	x	70	мг	140	3
	Метилпреднизолон	1 мг/кг на введение в/в каждые 12 ч в течение 3-х суток, с постепенным снижением дозы на 20 - 25% на введение каждые 1 - 2 суток в течение 3 - 4 суток, далее на 50% каждые 1 - 2 суток до полной отмены. При прогрессировании: 120 - 125 мг/введение/в/в каждые 6 - 8 ч.	1,55	x	70	мг	109	1,5
	Метилпреднизолон	1 мг/кг на введение в/в каждые 12 ч в течение 3-х суток, с постепенным снижением дозы на 20 - 25% на введение каждые 1 - 2 суток в течение 3 - 4 суток, далее на 50% каждые 1 - 2 суток до полной отмены. При прогрессировании: 120 - 125 мг/введение/в/в каждые 6 - 8 ч.	1,20	x	70	мг	84	1,5
	Метилпреднизолон	1 мг/кг на введение в/в каждые 12 ч в течение 3-х суток, с постепенным снижением дозы на 20 - 25% на введение каждые 1 - 2 суток в течение 3 - 4 суток, далее на 50% каждые 1 - 2 суток до полной отмены. При прогрессировании: 120 - 125 мг/введение/в/в каждые 6 - 8 ч.	0,60	x	70	мг	42	1,5
	Метилпреднизолон	1 мг/кг на введение в/в каждые 12 ч в течение 3-х суток, с постепенным снижением дозы на 20 - 25% на введение каждые 1 - 2 суток в течение 3 - 4 суток, далее на 50% каждые 1 - 2 суток до полной отмены. При прогрессировании: 120 - 125 мг/введение/в/в каждые 6 - 8 ч.	428,75	x	x	мг	429	1,5
	Нефракционированный гепарин	Подкожно 5000 ЕД 2 - 3 раза/сут.	12,5	x	x	тыс. ЕД	13	7,2
	Эноксапарин натрия	Подкожно 4000 анти-Ха МЕ (40 мг) 1 раз/сут.	4	x	x	тыс. анти-Ха МЕ	4	0,4
	Парнапарин натрия	Подкожно 0,3 мл (3200 анти-Ха МЕ) или 0,4 мг (4250 анти-Ха МЕ) 1 раз/сут	3200	x	x	анти-Ха МЕ	3 200	0,4

Сведения о схемах лечения COVID-19 (крайне тяжелое течение заболевания)

Схема 5.2	Дексаметазон	20 мг/сутки в/в в течение 3-х суток (по 10 мг Х 2 раза в сутки) в/в с постепенным снижением дозы на 20 - 25% на введение каждые 1 - 2 суток, в течение 3 - 4 суток, далее на 50% каждые 1 - 2 суток до полной отмены	20	x	x	мг	20	3
	Дексаметазон	20 мг/сутки в/в в течение 3-х суток (по 10 мг Х 2 раза в сутки) в/в с постепенным снижением дозы на 20 - 25% на введение каждые 1 - 2 суток, в течение 3 - 4 суток, далее на 50% каждые 1 - 2 суток до полной отмены	15,5	x	x	мг	16	1,5
	Дексаметазон	20 мг/сутки в/в в течение 3-х суток (по 10 мг Х 2 раза в сутки) в/в с постепенным снижением дозы на 20 - 25% на введение каждые 1 - 2 суток, в течение 3 - 4 суток, далее на 50% каждые 1 - 2 суток до полной отмены	12,01	x	x	мг	12	1,5
	Дексаметазон	20 мг/сутки в/в в течение 3-х суток (по 10 мг Х 2 раза в сутки) в/в с постепенным снижением дозы на 20 - 25% на введение каждые 1 - 2 суток, в течение 3 - 4 суток, далее на 50% каждые 1 - 2 суток до полной отмены	6,01	x	x	мг	6	1,5
	Нефракционированный гепарин	Подкожно 5000 ЕД 2 - 3 раза/сут.	12,5	x	x	тыс. ЕД	13	7,2
	Эноксапарин натрия	Подкожно 4000 анти-Ха МЕ (40 мг) 1 раз/сут.	4	x	x	тыс. анти-Ха МЕ	4	0,4
	Парнапарин натрия	Подкожно 0,3 мл (3200 анти-Ха МЕ) или 0,4 мг (4250 анти-Ха МЕ) 1 раз/сут	3200	x	x	анти-Ха МЕ	3 200	0,4
Схема 6.1	Тоцилизумаб	4 - 8 мг/кг/введение 400 мг разводят в 100 мл 0,9% раствора NaCl, вводят в/в капельно. Вводить не более 800 мг. При недостаточном эффекте повторить введение через 12 ч.	6	x	70	мг	420	1
	Тоцилизумаб	4 - 8 мг/кг/введение 400 мг разводят в 100 мл 0,9% раствора NaCl, вводят в/в капельно. Вводить не более 800 мг. При недостаточном эффекте повторить введение через 12 ч.	6	x	70	мг	420	0,1
	Нефракционированный гепарин	Подкожно 5000 ЕД 2 - 3 раза/сут.	12,5	x	x	тыс. ЕД	13	1,8
	Эноксапарин натрия	Подкожно 4000 анти-Ха МЕ (40 мг) 1 раз/сут.	4	x	x	тыс. анти-Ха МЕ	4	0,1
	Парнапарин натрия	Подкожно 0,3 мл (3200 анти-Ха МЕ) или 0,4 мг (4250 анти-Ха МЕ) 1 раз/сут	3200	x	x	анти-Ха МЕ	3 200	0,1
Схема 6.2	Сарилумаб	200 мг или 400 мг (предварительно заполненную шприц-ручку 200 мг) развести в 100 мл 0,9% раствора NaCl, вводить в/в, при недостаточном эффекте повторить введение через 12 ч.	200	x	x	мг	200	0,5
	Сарилумаб	200 мг или 400 мг (предварительно заполненную шприц-ручку 200 мг) развести в 100 мл 0,9% раствора NaCl, вводить в/в, при недостаточном эффекте повторить введение через 12 ч.	400	x	x	мг	400	0,5
	Сарилумаб	200 мг или 400 мг (предварительно заполненную шприц-ручку 200 мг) развести в 100 мл 0,9% раствора NaCl, вводить в/в, при недостаточном эффекте повторить введение через 12 ч.	200	x	x	мг	200	0,05
	Сарилумаб	200 мг или 400 мг (предварительно заполненную шприц-ручку 200 мг) развести в 100 мл 0,9% раствора NaCl, вводить в/в, при недостаточном эффекте повторить введение через 12 ч.	400	x	x	мг	400	0,05
	Нефракционированный гепарин	Подкожно 5000 ЕД 2 - 3 раза/сут.	12,5	x	x	тыс. ЕД	13	1,8
	Эноксапарин натрия	Подкожно 4000 анти-Ха МЕ (40 мг) 1 раз/сут.	4	x	x	тыс. анти-Ха МЕ	4	0,1
	Парнапарин натрия	Подкожно 0,3 мл (3200 анти-Ха МЕ) или 0,4 мг (4250 анти-Ха МЕ) 1 раз/сут	3200	x	x	анти-Ха МЕ	3 200	0,1
Схема 6.3	Канакинумаб	4 - 8 мг/кг. 150 мг в 1 мл воды для инъекций, далее вводят во флакон с 250 мл 5% раствора глюкозы.	6	x	70	мг	420	1
	Нефракционированный гепарин	Подкожно 5000 ЕД 2 - 3 раза/сут.	12,5	x	x	тыс. ЕД	13	1,8
	Эноксапарин натрия	Подкожно 4000 анти-Ха МЕ (40 мг) 1 раз/сут.	4	x	x	тыс. анти-Ха МЕ	4	0,1
	Парнапарин натрия	Подкожно 0,3 мл (3200 анти-Ха МЕ) или 0,4 мг (4250 анти-Ха МЕ) 1 раз/сут	3200	x	x	анти-Ха МЕ	3 200	0,1
Схема 7	Метилпреднизолон	1 мг/кг на введение в/в каждые 12 ч в течение 3-х суток, с постепенным снижением дозы на 20-25% на введение каждые 1-2 суток в течение 3-4 суток, далее на 50% каждые 1-2 суток до полной отмены. При прогрессировании: 120-125 мг/введение/в/в каждые 6-8 ч	x	x	x	x	x	x
	Левилимаб	162 мг×4 однократно внутривенно	x	x	x	x	x	x
	Антикоагулянтный препарат для парентерального введения	-	x	x	x	x	x	x
Схема 8	Дексаметазон	20 мг/сутки в/в в течение 3-х суток 2 (по 10 мг Х 2 раза в сутки) в/в с постепенным снижением дозы на 20-25% на введение каждые 1-2 суток, в течение 3-4 суток, далее на 50% каждые 1-2 суток до полной отмены	x	x	x	x	x	x
	Левилимаб	162 мг×4 однократно внутривенно	x	x	x	x	x	x
	Антикоагулянтный препарат для парентерального введения	-	x	x	x	x	x	x
	Дорогостоящие препараты упреждающей противовоспалительной терапии COVID-19							